

Frelon asiatique (Vespa velutina)



Aspect typique du frelon.

Tête noire et visage jaune orangé.

Thorax entièrement noir.

Dessus de l'abdomen noir avec bandes jaunes dont une large à l'arrière.

Extrémité des pattes jaune.

Taille : entre 17 et 32 mm de long.

Le Frelon asiatique construit un gros nid globuleux souvent haut perché dans les arbres. Il abrite la colonie constituée d'adultes et de larves. Les plus gros nids atteignent 1 m de hauteur et 80 cm de large.



Ne pas confondre le Frelon asiatique et le Frelon européen. Ce dernier fait partie de notre faune locale. Il est un peu plus gros et l'abdomen est presque entièrement jaune avec des dessins noirs.

Frelon asiatique (ou Frelon à pattes jaunes)

Insectes

Le Frelon asiatique est originaire d'Asie centrale et d'Asie du Sud-Est. Il est introduit involontairement en France (Lot et Garonne) en 2004.

En 2011, l'espèce a colonisé 50% de la France (moitié sud-ouest).

On trouve le Frelon asiatique dans le Marais poitevin depuis 2009.

C'est un prédateur qui nourrit ses larves carnivores avec des morceaux d'insectes. Les adultes consomment toute matière sucrée provenant des fleurs, des fruits ou du miel volé aux abeilles.

L'espèce est en phase de colonisation et son développement est spectaculaire, à l'image de la taille des gros nids qu'elle confectionne dans les arbres.

Au cours de l'été, au moment où il y a le plus de larves à nourrir, le Frelon asiatique se spécialise sur la capture des abeilles. L'impact économique sur les ruchers est alors important.

Devant cette invasion et les méfaits causés aux ruchers, les apiculteurs et les pouvoirs publics se mobilisent pour développer des principes de lutte basés sur le piégeage : Méthode non validée actuellement par les scientifiques car de nombreuses espèces d'insectes locaux trouvent la mort dans ces pièges.

50



La piqûre du Frelon asiatique est douloureuse. Comme pour toute piqure d'hyménoptère, les personnes allergiques doivent rester très vigilantes.